ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Коагулограмма	
•	АЧТВ
•	Протромбин
•	Фибриноген
•	Антитромбин

Клинический анализ крови:	
•	Общий анализ; СОЭ лейкоцитарная формула;
•	Группа крови
•	Резус-фактор

Биохимия	
•	АлАт
•	АсАт
•	Билирубин общий
•	Билирубин прямой
•	Глюкоза
•	Креатинин
•	Мочевина
•	Общий белок
•	Фосфатаза щелочная
•	K / Na / Cl

Инфекционные маркеры	
•	ВИЧ (Антиген + Антитела)
•	Сифилис RPR
•	HBs-Ag (гепатит B)
•	HCv-Ag (гепатит C)

Исследование мочи	
•	Общий анализ мочи

•	Рентгенологическое исследование органов грудной клетки или флюорография (действительно в течение года)

•	Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой

* Результаты анализов действительны в течение 2 недель

При планировании операции на молочной железе:

•	Ультразвуковое исследование молочных желез
•	Консультация маммолога

При наличии заболеваний вен нижних конечностей (имеющихся или ранее перенесенных):

•	УЗДГ вен нижних конечностей
•	Консультация сосудистого хирурга

* Требуется заблаговременно сообщить хирургу обо всех имеющихся хронических заболеваниях, наличии лекарственной непереносимости (аллергии на какие-либо лекарственные препараты), вредных привычках.

* Курящим пациентам следует обратить особое внимание, на то, что для благоприятного протекания послеоперационного периода и заживления послеоперационной раны целесообразен отказ от курения в течение 2-х недель до операции и в течение месяца после нее.

* Всем пациентам перед операцией с профилактической целью проводится эластическая компрессия нижних конечностей
Для этого **необходимо заранее приобрести компрессионные чулки**, размер которых вам помогут подобрать в аптеке.

* Вечером накануне операции - легкий ужин не позднее 19.00

* **Утром в день операции нельзя пить и принимать пищу!**

После выписки из стационара вам необходимо будет принимать следующие лекарственные препараты. Их целесообразно приобрести заранее

•	**Амоксиклав 625 мг**	1 таб. х 2 раза в день в течение 7 дней
•	**Бифиформ**	1 капсула х 2 раза в день в течение 2 недель
•	**Ксефокам 8 мг**	(Кетарол, Кетонал) 1 таб. х 3 раза в день после еды (при болях)
•	**Флогэнзим**	По 3 табл. 3 раза в сутки не разжевывая, за 30–40 мин до еды, запивая стаканом воды (150 мл) в течение 3-4 недель
•	**Панадол 500 мг**	1таб. х 2 раза в день (при повышении температуры)

* При отсутствии лекарственной непереносимости (аллергии) к перечисленным препаратам

Баков Вадим Сергеевич +7 965 285 50 30 bavad@mail.ru www.doctorbakov.ru

www.doctorbakov.ru