

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Коагулограмма

- АЧТВ
- Протромбин
- Фибриноген
- Антитромбин
- D-димер

Клинический анализ крови

- Общий анализ; лейкоцитарная формула; тромбоциты; СОЭ
- Группа крови и резус-фактор

Биохимический анализ крови

- АлАт
- АсАт
- Билирубин общий
- Билирубин прямой
- Глюкоза
- Креатинин
- Мочевина
- Общий белок
- Холестерол
- К / Na / Cl

Инфекционные маркеры

- ВИЧ (Антиген + Антитела)
- Сифилис RPR
- HBs-Ag (гепатит В)
- HCV-Ag (гепатит С)

Исследование мочи

- Общий анализ мочи

- Рентгенологическое исследование органов грудной клетки или флюорография (действительно в течение года)
- Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой. **При выявлении отклонений от нормы – консультация кардиолога!**
- УЗИ вен нижних конечностей. **При выявлении отклонений от нормы – консультация флеболога!**

При планировании операции на молочной железе:

- УЗИ молочных желез. **При выявлении отклонений от нормы – консультация маммолога!**

- Срок годности анализов на инфекционные маркеры – 1 месяц
- ЭКГ – 2 недели.
- Группа крови – бессрочно.
- **Результаты всех остальных анализов действительны в течение 10 дней!**

- Все результаты предоперационного обследования должны быть только на русском языке
- Их необходимо представить в клинику или переслать на почту analiz.art@nsi.ru не позднее, чем за 3 дня до операции
- **Ко дню операции все результаты предоперационного обследования должны быть представлены в клинику в виде оригиналов на бланках лечебного учреждения с фамилией и подписью выполнявшего их врача и синей печатью лечебного учреждения!**
- Копии документов представляются только для предварительного ознакомления и не являются основанием для допуска к операции

- * Требуется заблаговременно сообщить хирургу обо всех имеющихся хронических заболеваниях, наличии лекарственной непереносимости (аллергии на какие-либо лекарственные препараты), вредных привычках.
- * Курящим пациентам следует обратить особое внимание, на то, что для благоприятного протекания послеоперационного периода и заживления послеоперационной раны целесообразен отказ от курения в течение 2-х недель до операции и в течение месяца после нее.
- * Всем пациентам перед операцией с профилактической целью проводится эластическая компрессия нижних конечностей. Для этого необходимо заранее приобрести компрессионные чулки профилактической степени компрессии, размер которых вам помогут подобрать в аптеке.
- * Вечером накануне операции – легкий ужин не позднее 19.00
- * **В день операции за 6 часов до госпитализации в клинику исключить прием любой пищи и жидкости (включая воду)!**

После выписки из стационара вам необходимо будет принимать следующие лекарственные препараты. Их целесообразно приобрести заранее*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Амоксиклав 625 мг – 1 уп. при аллергии на препараты пенициллинового ряда – Цифран 500 мг – 1 уп.● Бифиформ – 1 уп. | <ul style="list-style-type: none">● Ксефокам 8 мг – 1 уп.● Флогэнзим – 1 уп.● Панадол 500 мг (растворимые таблетки) – 1 уп. |
|---|---|

- * При отсутствии лекарственной непереносимости (аллергии) к перечисленным препаратам